n°. 174.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

41 2026

M.r fabre m.e en chirurgie à avignon, a envoyé a l'academie deux observations qui ne me paroissent pas assés importantes pour mériter aucun prix. la premiere est sur un cancer ulceré à la levre inferieure gueri par extirpation. cette tumeur occupoit un grand pouce de cette levre, qui avoit été déja rétrécie par une extirpation précedente faite infructueusement. l'auteur jugea, contre le sentiment de plusieurs personnes de l'art, que l'operation étoit encore susceptible de tout le succès qu'on pouvoit désirer; elle réussit en effet en employant la suture entortillée avec les moyens accessoires propres à favoriser l'effet de cette suture, comme les emplatres agglutinatifs, le bandage unissant &c.

Dans la seconde observation, M.r fabre propose une méthode nouvelle pour reduire la luxation de la machoire inférieure. la voici: le malade étant assis sur une chaise, sa tete étant fixée par un aide le chirurgien se place à son coté gauche, un peu devant, il embrasse les ~~joues~~ joues du malade avec le pouce de la main gauche ~~~~ et l'indicateur de la même main; il appuye un peu fort ces deux doigts, de devant en arriere, sur l'une et l'autre apophise coronoïde de la machoire, et en même temps il éleve subitement celle ci en

ARC 20 d.19

la frappant sous le menton avec la paulme de la main droite, je crois en effet que ces forces et les mouvemens bien combinés peuvent reduire la machoire, mais il faut que l'experience justifie la superiorité de cette methode sur celles qu'on a employées jusqu'ici.

je porte le même jugement sur les trois observations de m.r Davan ~~de~~ lieutenant de m.r le premier chirurgien du Roy à Lavaur. la premiere est sur un coup de feu qu'un jeune homme recut à bout portant dans le temps qu'il etoit baissé pour bouclér ses souliers. le plomb en grenaille, dont le fusil etoit chargé, entra derriere l'angle de la machoire inferieure passa vraisem-blablement sous l'arcade zigomatique brisa l'orbite et emporta l'oeil du même coté. m.r Davan fit les dilatations necessaires passa un seton dans le trajet de la plaie, saigna copieuse-ment du bras et du pied le malade qui etoit tombé dans l'assoupissement, et qui fut gueri cinq semaines aprés le coup.

la seconde observation de m.r Davan ne presente point un fait bien interessant. il y est question d'une femme qui portoit depuis prés de huit mois à la region lombaire droite, une tumeur d'environ trois pouces de diametre,

et qui cependant, suivant l'auteur, s'étendoit anterieurement
sur le côté de cette region, et s'avançoit jusqu'à
deux travers de doigts de la ligne blanche; cette
tumeur étoit dure, tendue, transparente, sonnant
comme un balon quand on la frappoit, et sans
douleur ni changement de couleur à la peau.
L'auteur dit que la malade ne pouvoit être couchée
que sur le dos, et que lorsqu'elle se couchoit sur
le côté opposé à la tumeur sa respiration étoit
gênée, et son pouls petit et fréquent. Mr. Davan
jugea que cette tumeur étoit une timpanite
entre les tégumens et les muscles de l'abdomen;
il la perça avec un troicart crenelé qui
donna issue à beaucoup d'air, et la malade fut
guérie.

Enfin dans la troisieme observation Mr. Davan
fait l'histoire d'une femme qui avoit depuis
trois ans une enflure œdemateuse qui occupoit
toute l'habitude du corps, lorsque Mr. Davan vit
la malade, elle se plaignoit depuis trois semaines
d'une douleur vive avec élancement dans le
centre de l'hipogastre, où il y avoit un gonflement
séparé du reste du ventre par une ligne enfoncée
depuis la region iliaque droite jusqu'à la gauche,
on sentoit une fluctuation profonde dans le milieu
de cette tumeur où il y avoit une tache noire de
la grandeur d'une piece de douze sols; la

ACADÉMIE NATIONALE

malade avoit beaucoup de fievre et une forte alteration.
l'auteur se determina a faire une incision ~~dans le~~
~~centre de la tumeur~~ transversale de quatre travers
de doigts de longueur, dans le centre de la tumeur,
il en sortit d'abord beaucoup de serosité rougeatre
mais trouvant un grand vuide sous la peau, m.r
Davant fit une incision longitudinale qui
repondoit au centre de la premiere en tirant
vers le haut. cette ouverture spacieuse luy fit
decouvrir une nouvelle tumeur avec fluctuation
sous les mus. les droits ; aprés s'estre assuré
en sondant la malade, que ce n'Etoit point la
vessie qui l'a formoit il coupa ces muscles en
travers et donna issue a un demi septier de
pus blanc et assé louable. toutes les eaux qui
formaient l'anasarque s'Ecoulerent insensiblement
tous les jours par la plaie, et la malade fut guerie
au bout de cinq semaines; je pense que les incisions
transversales diminuent bien le mérite que
cette observation pourroit avoir.

ce 6 mars 1777.

fabre